



গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা

জেলা এগ্রোমেট শাখা, পুরুলিয়া

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, কল্যাণ

Ref: AAS/2019/15

তারিখ: ২৭.০৮.২০১৯

পুরুলিয়া জেলার আবহাওয়া ভিত্তিক পূর্বাভাস ও কৃষি পরামর্শ

(সময়কাল ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর)

বিগত তিনদিনের আবহাওয়া

রেকর্ড করা আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য অনুসারে বিগত তিন দিনের (২৪-২৬ আগস্ট পর্যন্ত) গড় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩ ও ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। গড় আপেক্ষিক আদ্রতা সর্বাধিক ৯৫ এবং সর্বনিম্ন ৮০ শতাংশ। গত তিন দিনে বৃষ্টির পরিমাণ যথাক্রমে ২, ২২ এবং ৬ মিমি। বিগত তিন দিনে বৃষ্টির পরিমাণ সামগ্রিকভাবে স্বাভাবিক এবং মাটির রসের অবস্থা অনুকূল ছিল।

আগামি পাঁচ দিনের মধ্যমাত্রার আবহাওয়া পূর্বাভাস					
তারিখ	২৮.৮.১৯	২৯.৮.১৯	৩০.৮.১৯	৩১.৮.১৯	০১.৯.১৯
আবহাওয়া পরিমাপক					
বৃষ্টিপাত (মিমি)	২.০	১০.০	৫.০	০.০	০.০
সর্বাধিক তাপমাত্রা (°C)	৩৩	৩২	৩৩	৩৩	৩৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	২৪	২৫	২৪	২৩	২৪
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘলা	মেঘাচ্ছন্ন	প্রধানত মেঘলা	মেঘাচ্ছন্ন	প্রধানত মেঘলা
সর্বাধিক আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৮	৮৫	৮৮	৯০	৮৫
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৯	৫৯	৫৬	৫০	৫৫
বায়ুর গতিবেগ (কিমি/ঘণ্টা)	১০.০	৮.০	৯.০	১২.০	১০.০
বায়ুর দিক নির্দেশ	দক্ষিণ পূর্ব	দক্ষিণ পূর্ব	দক্ষিণ পূর্ব	দক্ষিণ পূর্ব	দক্ষিণ পূর্ব

আবহাওয়া-ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ		
মুখ্য ফসল	পর্যায়	কৃষি পরামর্শ
আমন ধান	পাশকাঠি ছাড়া	• বর্তমান আবহাওয়া ধানের ধসা রোগের অনুকূল। এই রোগে পাতায় বাদামি রঙের চোখাকৃতি দাগ লক্ষ্য করা যায়। ফসলে রোগের

		<p>লক্ষন দ্যাখা গেলে ট্রাইসাইক্লোজোল @ ০.৬ বা প্রপিকোনাজোল @ ০.৬-১ গ্রাম প্রতি লিটার জলের সাথে প্রয়োগ করুন।</p> <ul style="list-style-type: none"> • সময়ে রোপণ করা ধানের ক্ষেত্রে মাজরা পোকাকার প্রাদুর্ভাব দ্যাখা যেতে পারে। তাই ফসল নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন এবং পোকাকার আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড 4G @ ৩-৩.৫ কেজি বিঘা প্রতি প্রয়োগ করুন। • যে সমস্ত চাষি ভাইরা জমিতে চারা রোপণ প্রায় দু থেকে তিন সপ্তাহ আগে সম্পন্ন করেছেন তারা চাপান সার হিসেবে ইউরিয়া বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি হারে প্রয়োগ করুন। • মূলজমির চারিপাশ নিড়ান বা রাসায়নিক আগাছানাশক প্রয়োগ করে আগাছা মুক্ত রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
মুগ/ কলাই	বৃদ্ধি দশা	<ul style="list-style-type: none"> • জুলাই মাসে বপন করা কলাই এর জমিতে আগাছা দমন করুন।
বাদাম	পুষ্পাবস্থা	<ul style="list-style-type: none"> • এই সময় বাদামের শিকড়ে সাদা পোকাকার আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। তাই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ফিপ্রনিল ০.৩% গ্রানুলস বিঘা প্রতি ১.৫ কেজি হারে প্রয়োগ করুন।
খারিফ সজ্জি	ফলাবস্থা	<ul style="list-style-type: none"> • শীতকালীন জলদি জাতের ফুলকপি ও বাধাকপির চারা প্রস্তুত করার জন্য উন্নতমানের বীজ শোধন করে নার্সারি তে লাগাতে পারেন। প্রতি বিঘা জমির জন্য ৮০ গ্রাম হারে বীজ লাগাতে পারেন। • বেগুন চাষে কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারি পোকাকার আক্রমণ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য স্পাইনসড ৪৫ EC @ ০.৫ মিলি বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড @ ১গ্রাম/লি বা নিমাস্ত্র ১০মিলি প্রতি লিটার একটি শুষ্ক ও পরিষ্কার দিনে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। • আদ্র ও মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়াতে করলা, কুমড়া, লাও, ঝিঙ্গেতে ডাউনি মিল্ডিউ রোগের সংক্রমণ দ্যাখা দিতে পারে। রোগ প্রতিরোধের জন্য মাক্সোজেব বা ক্লোরোথালোনিল @ ২গ্রাম প্রতি

		<p>লিটার ১০ দিন অন্তর অন্তর ২ বার শুষ্ক দিনে বিকেলের সময় স্প্রে করুন।</p> <ul style="list-style-type: none"> • লক্ষ্যে ল্যাঙ্গা পোকের আক্রমণ প্রতিহত করতে ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন ৫% ই সি ১০ মিলি প্রতি ১৫ লিটার জলে গুলে একটি পরিষ্কার দিনে স্প্রে করুন। তবে আগামী পাঁচ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় স্প্রে আপাতত বন্ধ রাখুন।
প্রাণী /মৎস্য/পোলট্রি		<ul style="list-style-type: none"> • গবাদি পশুর খাদ্যের সাথে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজের মিশ্রণ দিন এতে প্রাণীর স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এবং দুধের পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাবে। • আর্দ্র আবহাওয়ায় মুরগির পেটে কৃমির সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যথাসম্ভব মুরগির ঘর পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন এবং ঘরে যাতে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করুন।

<p>ড. মানস কুমার ভট্টাচার্য, নোডাল অফিসার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র কল্যাণ, পুরুলিয়া মোবাইল-8798313063</p>	<p>সুদীপ্ত ঠাকুর, বিষয়-বস্তু বিশেষজ্ঞ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র কল্যাণ, পুরুলিয়া মোবাইল- 9007968952</p>
---	---